

PROPRIETĂȚI ALE CERCURILOR ADJUNCTE UNUI TRIUNGHI

Prof. Ion Pătrașcu, Colegiul Național Frații Buzești, Craiova, Romania
Prof. Univ. Dr. Florentin Smarandache, University of New Mexico, U.S.A.

Proprietățile prezentate în acest articol se referă la axele radicale și la centrele radicale ale cercurilor adjuncte unui triunghi.

Definiția 1. Fiind dat un triunghi ABC, spunem despre cercul care trece prin vârfurile C, A și este tangent în A laturii AB că este un cerc adjunct triunghiului.

Observații. a) Cercul din definiția precedentă îl notăm \overline{CA}

b) Unui triunghi îi corespund în general 6 cercuri adjuncte diferite. Dacă triunghiul este isoscel acesta are 5 cercuri adjuncte diferite, iar dacă este echilateral există trei cercuri adjuncte diferite asociate triunghiului.

Teorema 1. (A. L. Crelle, 1816)

i). Cercurile adjuncte \overline{CA} , \overline{AB} , \overline{BC} , ale triunghiului oarecare ABC au un punct comun Ω cu proprietatea: $\sphericalangle \Omega AB \equiv \sphericalangle \Omega BC \equiv \sphericalangle \Omega CA$

ii). Cercurile adjuncte \overline{AC} , \overline{CB} , \overline{BA} , ale triunghiului oarecare ABC au un punct comun Ω' cu proprietatea: $\sphericalangle \Omega' AC \equiv \sphericalangle \Omega' BA \equiv \sphericalangle \Omega' CB$

Demonstratie i):

Fie Ω al doilea punct de pe intersecție al cercurilor \overline{CA} și \overline{AB} , (vezi fig.1).

Avem:

$$\sphericalangle \Omega CA \equiv \sphericalangle \Omega AB \quad \text{și} \quad \sphericalangle \Omega AB \equiv \sphericalangle \Omega BC$$

Într-adevăr primele unghiuri au ca măsură jumătate din măsura arcului $A\Omega$, iar cele din a doua congruență au ca măsură jumătate din măsura arcului $B\Omega$.

Obținem că:

$$\sphericalangle \Omega AB \equiv \sphericalangle \Omega BC \equiv \sphericalangle \Omega CA$$

Relația $\sphericalangle \Omega BC \equiv \sphericalangle \Omega CA$ arată că cercul circumscris triunghiului $B\Omega C$ este tangent în C laturii AC și este prin urmare cercul adjunct \overline{BC} .




Fig. 1

Observații:

a). Analog se demonstrează ii)

b). Punctul Ω se numește primul punct al lui Brocard⁽¹⁾, iar Ω' se numește al doilea punct al lui Brocard

c). Punctul lui Brocard Ω este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{CA} , \overline{AB} , \overline{BC} , iar punctul lui Brocard Ω' este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{AC} , \overline{CB} , \overline{CA} , ale triunghiului ABC.

Într-adevăr atât Ω cât și Ω' au puteri egale (nule) față de tripletele de cercuri adjuncte indicate, și prin urmare sunt centrele lor radicale.

Teorema 2. Punctele lui Brocard Ω și Ω' sunt puncte izogonale în triunghiul ABC.

Demonstratie:

Notăm $m(\sphericalangle \Omega AB) = \omega$.

Aplicând teorema sinusurilor în triunghiurile $A\Omega B$ și $A\Omega C$ obținem:

$$\frac{B\Omega}{\sin \omega} = \frac{c}{\sin(B\Omega A)} = \frac{A\Omega}{\sin(B - \omega)}$$

$$\text{și } \frac{A\Omega}{\sin \omega} = \frac{b}{\sin(A\Omega C)}.$$

Deoarece $m(\sphericalangle B\Omega A) = 180^\circ - m(\sphericalangle B)$;

$m(\sphericalangle A\Omega C) = 180^\circ - m(\sphericalangle A)$, rezultă că:

$$\frac{A\Omega}{B\Omega} = \frac{b \sin B}{c \sin A} = \frac{\sin(B - \omega)}{\sin \omega}$$

Dezvoltând $\sin(B - \omega)$ și ținând cont că $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$ și $\sin(A + C) = \sin B$ se obține:

$$\text{ctg } \omega = \text{ctg } A + \text{ctg } B + \text{ctg } C.$$

Dacă vom nota $m(\sphericalangle \Omega' AC) = \omega'$, raționând analog rezultă: $\text{ctg } \omega' = \text{ctg } A + \text{ctg } B + \text{ctg } C$.

Relațiile precedente conduc la $\omega = \omega'$ ceea ce arată că Ω și Ω' sunt puncte izogonale.

Observatie. Unghiul ω se numește unghiul lui Brocard și apare în multe formule și relații legate de geometria triunghiului (vezi[1]).

Teorema 3. Cercurile adjuncte \overline{CA} și \overline{BA} se intersectează pe simediana din A a triunghiului ABC.

Demonstratie:

Fie S al doilea punct de intersecție al cercurilor \overline{CA} și \overline{BA} (vezi fig.2) și $\{P\} = AS \cap BC$.

Observăm că $\sphericalangle SCA \equiv \sphericalangle SAB$ și $\sphericalangle SBA \equiv \sphericalangle SAC$ prin

urmare $\Delta SBA \sim \Delta SAC$, de unde obținem: $\frac{SB}{SC} = \frac{AB^2}{AC^2}$

(1)

Pe de altă parte din congruențele unghiulare amintite obținem: $\sphericalangle BSP \equiv \sphericalangle CSP$, iar cu teorema

bisectoarei în triunghiul BSC rezultă că: $\frac{SB}{SC} = \frac{PB}{PC}$ (2)

Din (1) și (2) rezulta $\frac{PB}{PC} = \frac{AB^2}{AC^2}$ ceea ce arată că AP este simediana din A a triunghiului ABC.




Fig. 2

Observatie. Teorema 3 exprimă faptul că două cercuri adjuncte care sunt tangente la două laturi ale unui triunghi, într-un vârf comun acestor laturi au ca axă radicală simediana triunghiului dusă din acel vârf.

Teorema 4. Cercurile adjuncte \overline{AB} și \overline{AC} se intersectează pe mediana din A a triunghiului ABC.

Demonstratie:

Fie D al doilea punct de intesecție al cercurilor \overline{AB} și \overline{AC} și $\{M\} = AD \cap BC$. Dreapta AD este axa radicală a cercurilor \overline{AB} și \overline{AC} , avem $MB^2 = MD \cdot MA = MC^2$, rezultă că M este mijlocul lui (BC).

Observatii.

a). Teorema 4 exprimă faptul că două cercuri adjuncte ale unui triunghi, tangente la același latură, au ca axă radicală mediana opusă respectivei laturii.

b). Din cele demonstrate rezultă că axele radicale a două cercuri adjuncte unui triunghi pot fi: cevienele Brocard $A\Omega$, $A\Omega'$, etc, simedianele triunghiului, medianele triunghiului sau laturile triunghiului. Într-adevăr, dacă considerăm într-un triunghi oarecare cercurile adjuncte \overline{BC} și \overline{CB} axa lor radicală este latura BC.

c). Relativ la centrele radicale ale cercurilor adjuncte am demonstrat că Ω și Ω' au această calitate. Deoarece în general un triunghi are 6 cercuri adjuncte, înseamnă că există $C_6^3 = 20$ de centre radicale corespunzătoare tripletelor diferite de cercuri adjuncte.

d). Vârfurile triunghiului ABC sunt centre radicale ale anumitor triplete de cercuri adjuncte.

Într-adevăr de exemplu, vârful C al triunghiului ABC este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{BC} , \overline{CB} și \overline{AC} pentru că trec toate prin același vârf C. De asemenea C este centrul radical al cercurilor \overline{BC} , \overline{CB} și \overline{CA} precum și al cercurilor \overline{BC} ,


Teorema 5. (L. Carnot-1803)

Coardele comune a trei cercuri secante două câte două sunt concurente.


Demonstratie:

Fie C_1, C_2, C_3 trei cercuri secante și a_1, a_2, a_3 axele radicale ale cercurilor (C_2, C_3) , (C_1, C_3) respectiv (C_1, C_2) (vezi figura 3.)

Notăm P intersecția dintre a_1 și a_2 rezultă că P va avea puteri egale față de toate cercurile, prin urmare P va fi situat și pe axa radicală a_3 a cercurilor (C_1, C_2) .



Teorema 6. (R.A. Johnson - 1929) Într-un triunghi ABC ceviana $A\Omega$, simediana din B și mediana din C sunt concurente.



Demonstratie:

Construim cercurile \overline{CA} , \overline{AB} și \overline{CB} .

Fig.4

Conform teoremei 1, al doilea punct de intersecție al cercurilor \overline{CA} și \overline{AB} este Ω , din teorema 2 rezultă că al doilea punct comun cercurilor \overline{AB} și \overline{CB} este, S, situat pe simediana din B (vezi fig. 4), iar conform teoremei 3, cercurile \overline{CA} și \overline{CB} se intersectează a doua oară în M, care aparține medianei din C a triunghiului ABC. Teorema Carnot afirmă că cevienele $A\Omega$, BS și CM sunt concurente. Am notat punctul de concurență cu I_A .

Observatii

- Punctul I_A este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{CA} , \overline{AB} , \overline{CB} .
- Teorema 6 se poate demonstra și folosind reciproca teoremei lui Ceva; pentru acesta trebuie calculat $\frac{BA_1}{A_1C}$, unde $\{A_1\} = A\Omega \cap BC$, se găsește $\frac{BA_1}{A_1C} = \frac{AC^2}{BC^2}$
- În același mod putem enunța și demonstra următoarele teoreme:

Teorema 7. Ceviana $B\Omega$, simediana din C și mediana din A sunt concurente într-un punct I_B care este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{AC} , \overline{CB} , \overline{AB} triunghiului ABC.

Teorema 8. Ceviane $C\Omega$, simediana din A și mediana din B ale triunghiului ABC sunt concurente într-un punct I_C care este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{CA} , \overline{BC} , \overline{BA} .

Teorema 9. Ceviana $A\Omega'$, simediana din C și mediana din B ale triunghiului ABC sunt concurente într-un punct, I_A' care este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{AC} , \overline{BC} , \overline{BA} .

Teorema 10. Ceviana $B\Omega'$, simediana din A și mediana din C ale triunghiului ABC sunt concurente într-un punct I_B' care este centrul radical al cercurilor \overline{BA} , \overline{CB} , \overline{CA} .

Teorema 11. Ceviana $C\Omega'$, simediana din B și mediana din A ale triunghiului ABC sunt concurente într-un punct I_C' care este centrul radical al cercurilor adjuncte \overline{AC} , \overline{CB} , \overline{AB} .

Obsevație: Dacă triunghiul ABC este isoscel, $AB=AC$, atunci cercul adjunct \overline{BC} coincide cu cercul adjunct \overline{CB} și obținem teorema:

În triunghiul isoscel ABC, $AB=AC$, simediana din B și mediana din C se intersectează în punctul lui Brocard Ω . Vezi [3]

Bibliografie:

- [1] Mihăileanu, N.N. Lecții complementare de geometrie, Editura didactică și pedagogică, București 1976; p 56 -57
- [2] Johson, R. A. Modern Geometry: An Elementary Treatise on the Geometry of the Triangle and the Circle. Boston, MA: Houghton Mifflin, pp. 263/286, 1929
- [3] Pătrașcu, I. O teoremă relativă la punctul lui Brocard, Gazeta Matematică anul LXXXIX, nr. 9/1984, p. 328 -329.